



പവിഴപ്പുറ്റുകളിലെ മറ്റു പലയിനം മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമാണ് ചാളകൾ. ഇവയെ വലിയ അളവിൽ പിടിക്കുന്നത് പവിഴ ദ്വീപുകളിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. അതുണ്ടാക്കാവുന്ന ആഘാതത്തിന്റെ അളവ് ഇതുവരെ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.



ചാള പവിഴദ്വീപുകളിലെ നിലനില്പിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ണിയാണ്. കൂടാതെ ഇവ ദ്വീപിന്റെ ഭക്ഷ്യ-ജൈവ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യ ഘടകമാണ്. ഇവയുടെ ലഭ്യത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനത്തിനെയും ബാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇവയുടെ പരിപാലനം ദ്വീപിന്റെ സാമ്പത്തിക-പരിസ്ഥിതിക സന്തുലനത്തിന് നിർണായകമാണ്.



ചാള ഏതു കാലാവസ്ഥയിൽ എവിടെയെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രാദേശികമായ അറിവുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇവയുടെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിമിതമാണ്. ഈ വിടവ് ഇവയുടെ സ്ഥിര ലഭ്യതയെ തടയുന്നു.



ആയതിനാൽ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഭാവി വികസന പദ്ധതികൾ ബില്ലങ്ങളുടെയും പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നവയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹങ്ങൾക്ക് അവയിലേക്ക് തുടർന്നും പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുന്നവയും ആയിരിക്കണം.



ചിത്രങ്ങൾ: ജോൺ ഹുവർ, പ്രേരണ ഗ്രൗഡെ, കെ ആർ കെ ഒ ഡൈവർ, ഫിഷ്ബേസ്

കണ്ടന്റ് ആന്റ് ഡിസൈൻ: പ്രേരണ ഗാവ്ഡേ (ദക്ഷിൺ ഫൗണ്ടേഷൻ)

ധനസഹായം നൽകിയത്: ബ്ലൂ വെഞ്ചേഴ്സ്, വാട്ടർലൂ ഫൗണ്ടേഷൻ, ടാറ്റാ ട്രസ്റ്റ്

പിന്തുണ നൽകിയത്: പരിസ്ഥിതി-വന വകുപ്പ്, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വകുപ്പ്, മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ്, ലക്ഷദ്വീപ്



ലക്ഷദ്വീപിലെ ചാളയിനങ്ങൾ

ലക്ഷദ്വീപിലെ പോൾ ആൻഡ് ലൈൻ (P&L) മത്സ്യബന്ധന രീതിയിൽ ചൂരയെ ആകർഷിച്ചു പിടിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ചെറിയ ഇരമത്സ്യങ്ങളാണ് ചാളകൾ. പൊതുവായി പാറക്കൂട്ടങ്ങളിലും പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്കിടയിലും ബില്ലങ്ങളിലും കടൽപ്പുല്ലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും കൂട്ടമായി കാണപ്പെടുന്ന ഇവ പോൾ ആൻഡ് ലൈൻ മത്സ്യബന്ധന രീതി നിലനിന്നു പോകുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

പ്രധാന ജീവശാസ്ത്ര വിശേഷണങ്ങൾ



പരമാവധി നീളം



ആയുർദൈർഘ്യം, ലൈംഗിക പക്വത



പ്രജനന രീതിയും കാലാവസ്ഥയും



മുട്ടയുടെ എണ്ണം



മത്സ്യബന്ധനരീതി



ഏകദേശം 10.5 സെ.മീ വരെ നീളം



ഒരു വർഷം വരെ ആയുർദൈർഘ്യം. ഏകദേശം 3 - 4 മാസം പ്രായവും 3.7 സെ.മീ വരെ നീളവും ആകുമ്പോൾ മുട്ടയിടാറാകുന്നു.



പുലർച്ചക്ക് മുൻപ് വലിയ കൂട്ടങ്ങളായാണ് ഇവ മുട്ടയിടുന്നത്. അമാവാസി ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ മുട്ടയിടുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. ഈയിനം മത്സ്യങ്ങൾ സാധാരണ പ്രജനന കാലത്തിനു പുറമെ വർഷത്തിൽ പലതവണ, പ്രത്യേകിച്ചും മഴക്കാലത്ത്, മുട്ടയിടാറുണ്ട്.



10500 മുട്ടകൾ വരെ ഇടുന്നു



നൈലോൺ അഥവാ പി വി സി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വൃത്തത്തിൽ ചുറ്റിനും ഈയക്കട്ടെ ഘടിപ്പിച്ച 1 മില്ലി മീറ്റർ (മുൻപ് 6 മില്ലി മീറ്റർ) കണ്ണികളുള്ള വലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.



ഹൊണ്ടലി

ശാസ്ത്രീയ നാമം: സ്പ്രാട്ടല്ലോയഡസ് ഡെലികാറ്റുലസ്

ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ ആഹാര ശൃംഖലയെയും പ്രത്യുത്പാദന സമയത്തെക്കുറിച്ചും അറിയുന്നത് അവയുടെ ലഭ്യതയെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു മത്സ്യം എപ്പോൾ മുട്ടയിടുന്നു എന്നറിയുന്നത് അവയെ പിടിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സമയത്തെ മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായും മത്സ്യ പരിപാലന നയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപകാരപ്രദമാകും.



റഹി

ശാസ്ത്രീയ നാമം: സ്പ്രാട്ടല്ലോയഡസ് ഗ്രാസിലിസ്



ഏകദേശം 7 സെ.മീ വരെ നീളം



ഒരു വർഷം വരെ ആയുർദൈർഘ്യം. ഉദ്ദേശം 3 - 4 മാസം പ്രായവും 3.5 സെ.മീ വരെ നീളവും ആകുമ്പോൾ മുട്ടയിടാറാകുന്നു



റഹി അതിന്റെ ജീവിത കാലയളവിൽ പല തവണ മുട്ടയിടുന്നു. ഇവയുടെ പ്രജനന രീതി ഹൊണ്ടലിയുടേതിനു സമാനമാണ്



6000 മുട്ടകൾ വരെ ഇടുന്നു




ചുറ്റിനും ഈയക്കട്ടെ ഘടിപ്പിച്ച വല ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വല വെള്ളത്തിൽ യഥാസ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി മുളങ്കമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.



ഏകദേശം 7.4 സെ.മീ വരെ നീളം



4 - 6 മാസം വരെ ആയുർദൈർഘ്യം. ഉദ്ദേശം 3 - 4 മാസം പ്രായം ആകുമ്പോൾ മുട്ടയിടാറാകുന്നു



ബോധി

ശാസ്ത്രീയ നാമം: സിസ്സിയോ സീറുലേറിയ



ജീവിത കാലയളവിൽ പല തവണ മുട്ടയിടുന്നു. ഇണയെ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം പെൺ മത്സ്യങ്ങൾ വലിയ അളവിൽ മുട്ടകളിടുന്നു. ഈ മുട്ടകൾ വിരിയുന്നത് വരെ ആൺ മീനുകൾ അവയുടെ വായിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു



ഉദ്ദേശം 1500 - 3225 മുട്ടകൾ ഇടുന്നു



പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്കു മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഇവയെ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലങ്കിൽ നൈലോൺ വലകൾ കൊണ്ടാണ് പിടിക്കുന്നത്



നീല മാഹി

ശാസ്ത്രീയ നാമം: ക്രോമിസ് വിരിഡിസ്



ഏകദേശം 10 സെ.മീ വരെ നീളം



1 - 2 വർഷം വരെ ആയുർദൈർഘ്യം



അർത്ഥചന്ദ്ര ചക്രഗതിയിൽ - അമാവാസിയിലെയും പൗർണമിയിലെയും രാത്രികളിൽ ആൺ മത്സ്യങ്ങളും പെൺ മത്സ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ബീജ സങ്കലനത്തിലേർപ്പെടുന്നു



ഉദ്ദേശം 1300 - 1500 മുട്ടകൾ വരെ ഇടുന്നു. ഈ മുട്ടകൾ 2 - 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിരിയുന്നു



മോണോഫിലമെൻറ് വല ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്



മുക്റം

ശാസ്ത്രീയ നാമം: സിസ്സിയോ സീറുലേറിയ



ഏകദേശം 35 സെ.മീ വരെ നീളം



വളരെ പെട്ടെന്ന് മുട്ടയിടാറാകുന്ന ഇവയ്ക്ക് പ്രത്യുത്പാദന ശേഷി കൂടുതലാണ്. വിപുലമായ ഇണചേരലിനൊടുവിൽ സുതാര്യമായ മുട്ടകൾ തുറന്ന സമുദ്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു



വർഷം തോറും വലിയ കൂട്ടങ്ങളായാണ് ഇവ മുട്ടയിടുന്നത്. പൗർണമി ദിവസങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ, പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്കിടയിലെ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇവ മുട്ടയിടാറുള്ളത്.



5 മില്ലി മീറ്റർ കണ്ണികളുള്ള, പി. വി. സി. യുടെ മോണോഫിലമെൻറ് (ഒറ്റ ഈയുള്ള) കോരുവല ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.